

Plodina alebo okolnosti		ovocné stromy jabloň domáca <i>(Malus domestica)</i> broskyňa obyčajná <i>(Prunus persica)</i>	
Použitie vonku alebo na poli (F), použitie v skleníkoch (G) alebo v interiéroch (I)		F – použitie vonku alebo na poli	
Regulovaní škodcovia alebo skupina škodcov		hubové choroby na listoch ako chrastavitosť jablík <i>(Venturia inaequalis)</i> , múčnatka jabloňová <i>(Podosphaera leucotricha)</i> , kučeravosť broskyňových listov <i>(Taphrina deformans)</i>	
Odvar prasličky	formulácia	DC – dispergovateľný koncentrát*	
	obsah účinnej látky	20 g/l	
Aplikácia	druh metódy	postrek**	
	rastová fáza a obdobie	jar, od pučania pupeňov: viditeľných kvetov obklopených špičkami zelených listov (BBCH 53) do dokvitanie, keď väčšina korunných lupienkov je opadaných (BBCH 67)	
	počet za vegetáciu (min., max.)	2 – 6	
	interval medzi aplikáciami (min.)	7 dní	
Dávka postreku		500 – 1 000 l/ha***	
Príprava postreku	pri dávke postreku	500 l	1 000 l
	odvar prasličky	50 l	100 l
	voda	450 l	900 l
Ochranná doba		žiadna	
Poznámky		Odvar použiť do 24 hodín po príprave.	

*Odvar je rastlinný homogenát extrahovaný horúcou vodou, filtrovaný (na použitie 10-násobne riedený)

**Neaplikovať v prípade vysokej teploty vzduchu.

***Pri príprave postreku dodržať 10-násobné riedenie odvaru, pomer riedenia je 1:9 (1 diel odvaru + 9 dielov vody).