

### Použitie ako fungicíd proti múčnatke viniča

Plodina alebo okolnosti		<b>vinič hroznorodý</b> ( <i>Vitis vinifera</i> )
Použitie vonku alebo na poli (F), použitie v skleníkoch (G) alebo v interiéroch (I)		F – použitie vonku alebo na poli
Regulovaní škodcovia alebo skupina škodcov		<b>hubové choroby</b> <b>múčnatka viniča</b> ( <i>Uncinula necator</i> )
Chlorid sodný	formulácia	SP – prášok rozpustný vo vode
	obsah účinných látok	> 970 g/kg
Aplikácia	druh metódy	postrek
	rastová fáza a obdobie	od začiatku vývinu 1. listu (BBCH 10) do celkom vyvinutej metliny, oddelených kvetov (BBCH 57) jar až leto
	počet za vegetáciu	1 – 2
	interval medzi aplikáciami	-
Aplikačná dávka	chlorid sodný	1,2 – 4,0 kg/ha*
	voda	200 l/ha
Ochranná doba		30 dní
Poznámky		Opatrná aplikácia, zabránenie stekania postreku z listov na pôdu. Nezasoľovať pôdu!
		Odporúča sa nestriekať každý rok, len vo výnimočných prípadoch.

\* V prípade 2 aplikácií: prvá dávka 4 kg/ha chloridu sodného a druhá 2 kg/ha chloridu sodného. Maximálna celková dávka soli nesmie prekročiť za rok 6 kg/ha.