

Plodina alebo okolnosti		ovocné stromy napr.: jabloň domáca <i>(Malus domestica)</i> rod hruška <i>(Pyrus sp.)</i> oliva európska <i>(Olea europea)</i> , atď.
Použitie vonku alebo na poli (F), použitie v skleníkoch (G) alebo v interiéroch (I)		F – použitie vonku alebo na poli
Regulovaní škodcovia alebo skupina škodcov		hmyz a roztoče ako méra hrušková <i>(Cacopsylla pyri)</i> méra <i>(Cacopsylla fulguralis)</i> drozofila japonská <i>(Drosophila suzukii)</i> roztočec ovocný <i>(Panonychus ulmi)</i> vrtivka škodiaca na olivách <i>(Bactrocera oleae)</i>
Mastenec E553b	formulácia	WP – dispergovateľný (zmáčateľný) prášok
	obsah účinnej látky	závisí od použitého produktu a čistoty
Aplikácia	druh metódy	postrek*
	rastová fáza a obdobie	od ukončeného rastu výhonkov (BBCH 41)
	počet za vegetáciu (min., max.)	2 – 5
	interval medzi aplikáciami (min.)	3 – 4 týždne**
Aplikačná dávka	mastenec E553b	1. aplikácia: 21,25 kg/ha ďalšie aplikácie: 17,00 kg/ha
	voda (min., max.)	600 až 1 000 l/ha
Ochranná doba		žiadna
Poznámky		Nepriame pôsobenie, žiadne priame fungicídne účinky – fyzická bariéra, repelent.

*Aplikovať skoro ráno alebo neskoro večer, aby sa dosiahla maximálna účinnosť. Postrek nepoužívať na mokré rastliny alebo v prípade daždivého počasia. Postrek sa pripravuje tesne pred aplikáciou a kontinuálne sa mieša.

**Po silnom daždi musí byť vykonaná nová aplikácia pre obnovenie ochrannej vrstvy.