

Plodina alebo okolnosti		rajčiak jedlý (<i>Solanum lycopersicum</i>)
Použitie vonku alebo na poli (F), použitie v skleníkoch (G) alebo v interiéroch (I)		F – použitie vonku alebo na poli
Regulovaní škodcovia alebo skupina škodcov		múčnatka rajčiaková (<i>Oidium neolycopersici</i>)
Snečnicový olej	formulácia	OD – suspenzný koncentrát na báze oleja
	obsah účinnej látky	915 – 923 g/kg
Aplikácia	druh metódy	postrek*
	rastová fáza a obdobie	od druhej sekundárnej apikálnej bočnej stonky viditeľnej (BBCH 32)* do siedmej sekundárnej apikálnej bočnej stonky viditeľnej (BBCH 37)* okrem toho od prvého súkvetia: prvého kvetu otvoreného (BBCH 61) do prvého strapca plodov: prvého plodu s typickou veľkosťou (BBCH 71)
	počet za vegetáciu (min., max.)	2 – 4
	interval medzi aplikáciami (min.)	8
Aplikačná dávka	snečnicový olej	0,5 – 5 l/ha
	voda	500 – 1 000 l/ha
Ochranná doba		2 dni
Poznámky		Musia sa prijať preventívne opatrenia, aby sa zabránilo nadmernému postrekovaniu a rozliatiu disperzie.
		Nemal by sa aplikovať v čase kvitnutia.

*Rastová fáza pre rajčiak s ukončeným rastom stonky – kríčkovú formu; pre rajčiak s neukončeným rastom stonky (kolíkovú formu) sa rastové fázy 21 – 49 neuplatňujú, pretože namiesto apikálnych bočných stoniek sa vytvárajú kvetenstvá (BBCH 51 – 60).