

Použitie proti roztočom

Plodina alebo okolnosti		strukoviny (všetky druhy) fazuľa záhradná (<i>Phaseolus vulgaris</i>)	
Použitie vonku alebo na poli (F), použitie v skleníkoch (G) alebo v interiéroch (I)		F – použitie vonku alebo na poli	
Regulovaní škodcovia alebo skupina škodcov		roztočec chmeľový (<i>Tetranychus urticae</i>)	
Macerát z prhl'avy	formulácia	DC – dispergovateľný koncentrát*	
	obsah účinnej látky	75 g/l (čerstvá prhl'ava) alebo 15 g/l (suchá hmota)	
Aplikácia	druh metódy	postrek	
	rastová fáza a obdobie	jar – leto do plnej zrelosti (BBCH 89)	
	počet za vegetáciu (min., max.)	1 – 6 (bežne 3)	
	interval medzi aplikáciami (min.)	7 – 21 dní (bežne 2 alebo 3 týždne)	
Dávka postreku		300 – 500 l/ha**	
Príprava postreku	pri dávke postreku	300 l	500 l
	macerát z prhl'avy	60 l	100 l
	voda	240 l	400 l
Ochranná doba		7 dní	
Poznámky		Stačí 24 hodín macerácie pri 20 °C.	

*Macerát je rastlinný homogenát extrahovaný studenou vodou, filtrovaný (na použitie 5-násobne riedený).

**Pri príprave postreku dodržať 5-násobné riedenie macerátu, pomer riedenia je 1:4 (1 diel macerátu + 4 diely vody).