

Plodina alebo okolnosti	rod javor – všetky druhy (<i>Acer spp.</i>) rod pagaštan (<i>Aesculus L.</i>) rod buk – všetky druhy (<i>Fagus spp.</i>)	
Použitie vonku alebo na poli (F), použitie v skleníkoch (G) alebo v interiéroch (I)	F – použitie vonku alebo na poli	
Regulovaní škodcovia alebo skupina škodcov	rakovina kôry (<i>Cryptostroma corticale</i>)	
Ocot	formulácia	kvapalina na dezinfekciu náradia
	obsah účinných látok	80 g/l (8 %)*
Aplikácia	druh metódy	dezinfekcia náradia pred použitím**
	rastová fáza a obdobie	1 krát za deň až pred každým použitím
	počet za vegetáciu (min., max.)	1 strom
Koncentrácia roztoku octu použitého na dezinfekciu	0,4 %***	
Príprava roztoku	ocot 8 %	0,05 l
	voda	0,95 l
Ochranná doba	žiadna	
Poznámky	čakacia doba 30 sekúnd po umyti	

*Vyjadrené ako kyselina octová.

**Dezinfekcia náradia použitého pred pílením alebo rezaním stromov.

***Vyjadrené ako kyselina octová, pri príprave roztoku je potrebné 50 ml 8 % octu zriediť s 950 ml vody.

Plodina alebo okolnosti		rod javor – všetky druhy (<i>Acer spp.</i>) pajaseň žliazkatý (<i>Ailanthus altissima</i>)
Použitie vonku alebo na poli (F), použitie v skleníkoch (G) alebo v interiéroch (I)		F – použitie vonku alebo na poli
Regulovaní škodcovia alebo skupina škodcov		vädnutie rod <i>verticillium</i> (<i>Verticillium spp.</i>)
Ocot	Formulácia	kvapalina na dezinfekciu náradia
	Koncentrácia účinných látok g/l	80 g/l (8 %) *
Aplikácia	Druh metódy	dezinfekcia náradia pred použitím **
	Počet (min., max.)	1 krát za deň až pred každým použitím
	Interval medzi aplikáciami (min.)	1 strom
Koncentrácia roztoku octu použitého na dezinfekciu		0,4 % ***
Príprava roztoku	ocot 8 %	0,05 l
	voda	0,95 l
Ochranná doba		žiadna
Poznámky		čakacia doba 30 sekúnd po umytí

*Vyjadrené ako kyselina octová.

**Dezinfekcia náradia použitého pred pílením alebo rezaním stromov.

***Vyjadrené ako kyselina octová, pri príprave roztoku je potrebné 50 ml 8 % octu zriediť s 950 ml vody.