

**Použitie proti roztočom**

|                                                                                     |                                   |                                                            |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|
| Plodina alebo okolnosti                                                             |                                   | <b>viníh hroznorodý</b><br>( <i>Vitis vinifera</i> )       |       |
| Použitie vonku alebo na poli (F), použitie v skleníkoch (G) alebo v interiéroch (I) |                                   | F – použitie vonku alebo na poli                           |       |
| Regulovanie škodcov alebo skupina škodcov                                           |                                   | <b>roztočec chmeľový</b><br>( <i>Tetranychus urticae</i> ) |       |
| Macerát z prhlavy                                                                   | formulácia                        | DC – dispergovateľný koncentrát*                           |       |
|                                                                                     | obsah účinnej látky               | 75 g/l (čerstvá prhlava) alebo<br>15 g/l (suchá hmota)     |       |
| Aplikácia                                                                           | druh metódy                       | postrek                                                    |       |
|                                                                                     | rastová fáza a obdobie            | jar – leto<br>do<br>bobúľ zrelých pre zber<br>(BBCH 89)    |       |
|                                                                                     | počet za vegetáciu (min., max.)   | 1 – 6<br>(tri pred kvitnutím, tri po odkvitnutí)           |       |
|                                                                                     | interval medzi aplikáciami (min.) | 7 – 21 dní<br>(bežne 2 alebo 3 týždne)                     |       |
| Dávka postreku                                                                      |                                   | 300 – 600 l/ha**                                           |       |
| Príprava postreku                                                                   | pri dávke postreku                | 300 l                                                      | 600 l |
|                                                                                     | macerát z prhlavy                 | 60 l                                                       | 120 l |
|                                                                                     | voda                              | 240 l                                                      | 480 l |
| Ochranná doba                                                                       |                                   | 7 dní                                                      |       |
| Poznámky                                                                            |                                   | Stačí 24 hodín macerácie pri 20 °C.                        |       |

\*Macerát je rastlinný homogenát extrahovaný studenou vodou, filtrovaný (na použitie 5-násobne riedený).

\*\*Pri príprave postreku dodržať 5-násobné riedenie macerátu, pomer riedenia je 1:4 (1 diel macerátu + 4 diely vody).