

Použitie proti hubovým chorobám

Plodina alebo okolnosti		uhorka siata (<i>Cucumis sativus</i>)
Použitie vonku alebo na poli (F), použitie v skleníkoch (G) alebo v interiéroch (I)		G – použitie v skleníkoch F – použitie vonku alebo na poli
Regulovaní škodcovia alebo skupina škodcov		múčnatka uhorková (pôvodcovia ochorenia napr.: <i>Podosphaera xanthii</i> , <i>Podosphaera fusca</i> , <i>Podosphaera fuliginea</i> , <i>Golovinomyces cichoracearum</i> , <i>Golovinomyces orontii</i> , <i>Leveillula cucurbitacearum</i> , príp. iní pôvodcovia) padanie klíčnych rastlín uhorky (pôvodca ochorenia napr. <i>Pythium</i> spp.)
Príhľava	formulácia	D – suchá rastlina*
	obsah účinnej látky	1 000 g/kg
Aplikácia	druh metódy	mulčovanie
	rastová fáza a obdobie	nie je dôležitá
	počet (min., max.)	1
	interval medzi aplikáciami (min.)	žiadny
Aplikačná dávka	príhľava	8,3 kg
	mulč	100 kg
Ochranná doba		nie je dôležitá

*Vysušené rastliny príhľavy tvoria zložku mulču, sú vmiešané do materiálu použitého na mulčovanie.