

Použitie ako fungicíd proti peronospóre viniča

Plodina alebo okolnosti		vinič hroznorodý (<i>Vitis vinifera</i>)
Použitie vonku alebo na poli (F), použitie v skleníkoch (G) alebo v interiéroch (I)		F – použitie vonku alebo na poli
Regulovaní škodcovia alebo skupina škodcov		hubové choroby peronospóra viniča (<i>Plasmopara viticola</i>)
Chlorid sodný	formulácia	SP – prášok rozpustný vo vode
	obsah účinných látok	> 970 g/kg
Aplikácia	druh metódy	postrek
	rastová fáza a obdobie	od začiatku vývinu 1. listu (BBCH 10) do uzatvárania strapcov, väčšina bobúľ sa navzájom dotýka (BBCH 79) jar až leto
	počet za vegetáciu	1 – 8
	interval medzi aplikáciami	-
Aplikačná dávka	chlorid sodný	0,1 – 2,0 kg/ha*
	voda	100 – 300 l/ha
Ochranná doba		30 dní
Poznámky		Opatrná aplikácia, zabránenie stekania postreku z listov na pôdu. Nezasoľovať pôdu!
		Odporúča sa nestriekať každý rok, len vo výnimočných prípadoch.

* Pri ošetrení proti plesni by maximálna celková aplikačná dávka chloridu sodného nemala presiahnuť 2 kg/ha za rok.