

Plodina alebo okolnosti		vinič hroznorodý (<i>Vitis vinifera</i>)
Použitie vonku alebo na poli (F), použitie v skleníkoch (G) alebo v interiéroch (I)		F – použitie vonku alebo na poli
Regulovaní škodcovia alebo skupina škodcov		múčnatka viniča (<i>Uncinula necator</i>)
Hydrogénuhličitan sodný	formulácia	SP – prášok alebo tuhý koncentrát rozpustný vo vode
	obsah účinnej látky	990 g/kg
Aplikácia	druh metódy	rosenie
	rastová fáza a obdobie	od dvoch vyvinutých listov (BBCH 12) do nástupu zberovej zrelosti bobúľ (BBCH 89)
	počet za vegetáciu (min., max.)	1 – 8
	interval medzi aplikáciami (min.)	10 dní
Aplikačná dávka	hydrogénuhličitan sodný	2,5 – 5,0 kg/ha*
	voda	200 – 600 l/ha*
Ochranná doba		1 deň
Poznámky		Koncentrácia vyššia ako 2 % môže byť fytotoxická.

*Dávka hydrogénuhličitanu sodného a vody musí byť upravená vzhľadom na odporúčanú koncentráciu postreku 0,42 – 2,0 %. Koncentrácia hydrogénuhličitanu sodného v pripravenom postreku nesmie byť vyššia ako 2 %.