

Plodina alebo okolnosti		ovocné stromy napr.: jabloň domáca (<i>Malus domestica</i>) rod hruška (<i>Pyrus</i> sp.)
Použitie vonku alebo na poli (F), použitie v skleníkoch (G) alebo v interiéroch (I)		F – použitie vonku alebo na poli
Regulovaní škodcovia alebo skupina škodcov		hubové choroby na listoch ako chrastavitosť jablák (<i>Venturia inaequalis</i>) chrastavitosť hrušiek (<i>Venturia pyrina</i>)
Mastenec E553b	formulácia	WP – dispergovateľný (zmáčateľný) prášok
	obsah účinnej látky	závisí od použitého produktu a čistoty
Aplikácia	druh metódy	postrek*
	rastová fáza a obdobie	od ukončeného rastu výhonkov (BBCH 41)
	počet za vegetáciu (min., max.)	2 – 5
	interval medzi aplikáciami (min.)	2 – 3 týždne**
Aplikačná dávka	mastenec E553b	12,75 kg/ha
	voda (min., max.)	600 až 1 000 l/ha
Ochranná doba		žiadna
Poznámky		Nepriame pôsobenie, žiadne priame fungicídne účinky – fyzická bariéra, repelent.

*Aplikovať skoro ráno alebo neskoro večer, aby sa dosiahla maximálna účinnosť. Postrek nepoužívať na mokré rastliny alebo v prípade daždivého počasia. Postrek sa pripravuje tesne pred aplikáciou a kontinuálne sa mieša.

**Po silnom daždi musí byť vykonaná nová aplikácia pre obnovenie ochrannej vrstvy.