

Použitie ako insekticíd

Plodina alebo okolnosti		vinič hroznorodý (<i>Vitis vinifera</i>)
Použitie vonku alebo na poli (F), použitie v skleníkoch (G) alebo v interiéroch (I)		F – použitie vonku alebo na poli
Regulovaní škodcovia alebo skupina škodcov		obaľovač mramorovaný (<i>Lobesia botrana</i>)
Chlorid sodný	formulácia	SP – prášok rozpustný vo vode
	obsah účinných látok	> 970 g/kg
Aplikácia	druh metódy	postrek
	rastová fáza a obdobie	1. aplikácia koncom apríla až do mája: od nalievajúcej sa metliny, kvetov zatvorených a stlačených dohromady (BBCH 55) do metliny celkom vyvinutej, kvetov oddelených (BBCH 57) 2. aplikácia júl: od bobúľ veľkosti hrášku, strapca ovisnutého (BBCH 75) do začiatku dotýkania sa bobúľ, zatvárania strapca (BBCH 77) 3. aplikácia september: od bobúľ jasno sfarbených (BBCH 83) do konca vyzrievania dreva, po zbere (BBCH 91)
	počet za vegetáciu	1 – 3
	interval medzi aplikáciami	v závislosti od štádia vajíčok
Aplikačná dávka	chlorid sodný	1,2 kg/ha
	voda	200 l/ha
Ochranná doba		30 dní
Poznámky		Opatrná aplikácia, zabránenie stekania postreku z listov na pôdu. Nezasoľovať pôdu!
		Odporúča sa nestriekať každý rok, len vo výnimočných prípadoch.