

|                                            |                                   |                                                                                  |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Plodina alebo okolnosti                    |                                   | <b>vinič hroznorodý</b><br>( <i>Vitis vinifera</i> )                             |
| Regulovaní škodcovia alebo skupina škodcov |                                   | <b>múčnatka viniča</b><br>( <i>Uncinula necator</i> )                            |
| Mastenec E553b                             | formulácia                        | WP – dispergovateľný (zmáčateľný) prášok                                         |
|                                            | obsah účinnej látky               | závisí od použitého produktu a čistoty                                           |
| Aplikácia                                  | druh metódy                       | postrek*                                                                         |
|                                            | rastová fáza a obdobie            | od 10 a viac listov vyvinutých (BBCH 20)                                         |
|                                            | počet za vegetáciu (min., max.)   | 2 – 5                                                                            |
|                                            | interval medzi aplikáciami (min.) | 3 – 4 týždne**                                                                   |
| Aplikačná dávka                            | mastenec E553b                    | 12,75 kg/ha                                                                      |
|                                            | voda (min., max.)                 | 150 až 300 l/ha                                                                  |
| Ochranná doba                              |                                   | žiadna                                                                           |
| Poznámky                                   |                                   | Nepriame pôsobenie, žiadne priame fungicídne účinky – fyzická bariéra, repelent. |

\*Aplikovať skoro ráno alebo neskoro večer, aby sa dosiahla maximálna účinnosť. Postrek nepoužívať na mokré rastliny alebo v prípade daždivého počasia. Postrek sa pripravuje tesne pred aplikáciou a kontinuálne sa mieša.

\*\*Po silnom daždi musí byť vykonaná nová aplikácia pre obnovenie ochrannej vrstvy.