

Plodina alebo okolnosti		rajčiak jedlý ako zelenina (<i>Solanum lycopersicum</i>)
Použitie vonku alebo na poli (F), použitie v skleníkoch (G) alebo v interiéroch (I)		F – použitie vonku alebo na poli G – použitie v skleníkoch
Regulovaní škodcovia alebo skupina škodcov		vírus žltej kučeravosti rajčiaka (<i>Begomovirus</i>)
Srvátka	formulácia	TC – technický materiál
	obsah účinných látok	60 – 80 g/l
Aplikácia	druh metódy	postrek*
	rastová fáza a obdobie	od kľúčnych listov celkom vyvinutých (BBCH 10) do 1. súkvetia viditeľného (BBCH 51)
	počet za vegetáciu (min., max.)	3 – 5
	interval medzi aplikáciami (min.)	3 – 4 dní
Aplikačná dávka	srvátka	6 – 30 l/ha
	voda	1 000 – 1 500 l/ha
Ochranná doba		žiadna
Poznámky		Nepoužívať, ak je akákoľvek rastlina v skleníku v neskoršom štádiu rastu ako BBCH 51.
		Srvátka by sa mala použiť ihneď po odbere, neuskladňovať v kovovej nádobe

*Postrek realizovať za slnečného počasia (najlepšie ráno).