

### Použitie ako fungicíd

Plodina alebo okolnosti		<b>huby ako pečiarka dvojjvýtrusná (<i>Agaricus bisporus</i>)</b>
Použitie vonku alebo na poli (F), použitie v skleníkoch (G) alebo v interiéroch (I)		G – použitie v skleníkoch
Regulovaní škodcovia alebo skupina škodcov		<b>hubové choroby ako <i>Cladobotryum</i> spp. (t.j. <i>Cladobotryum mycophilum</i>) <i>Lecanicillium (Verticillium) fungicola</i> <i>Mycogone perniciosa</i></b>
Chlorid sodný	formulácia	GR – granule
	obsah účinných látok	> 970 g/kg
Aplikácia	druh metódy	lokálny posyp
	rastová fáza a obdobie	Po objavení patogénu. Nie skôr ako 16. deň rastového cyklu.
	počet za vegetáciu	1
	interval medzi aplikáciami	-
Aplikačná dávka	chlorid sodný	0,03 g/kg substrátu 0,08 – 0,1 kg/ha
	voda	suchý
Ochranná doba		-
Poznámky		Soľ sa používa na lokálne posypanie vyskytujúcich sa prejavov chorôb.
		Výskyt choroby ja potrebné včas z identifikovať a lokálne ošetriť, čo umožní zabrániť náhodnému šíreniu choroby a jej prenosom na iné miesta.
		Pri slabom výskyte choroby sa predchádza použitiu veľkých dávok soli.