

Plodina alebo okolnosti		tržná zelenina ako rajčiak jedlý <i>(Solanum lycopersicum)</i> paprika – všetky druhy <i>(Capsicum spp.)</i> kapusta obyčajná <i>(Brassica oleracea)</i>	
Použitie vonku alebo na poli (F), použitie v skleníkoch (G) alebo v interiéroch (I)		F – použitie vonku alebo na poli	
Regulovaní škodcovia alebo skupina škodcov		bakteriálne vädnutie rajčiaka <i>(Clavibacter Michiganensis subsp. michiganensis)</i> baktériová bodkovitosť rajčiaka <i>(Pseudomonas syringae pv. Tomato)</i> baktériová škvrnitosť rajčiaka, baktériová škvrnitosť listov papriky <i>(Xanthomonas campestris pv. Vesicatoria)</i> sivá krčková hniloba, plesňovec cibulový <i>(Botrytis allii)</i>	
Ocot	formulácia	LS – moridlo kvapalné na priame použitie alebo po zriedení vodou	
	obsah účinných látok	80 g/l (8 %)*	
Aplikácia	druh metódy	morenie**	
	rastová fáza a obdobie	podľa výsevu	
	počet za vegetáciu (min., max.)	1	
Koncentrácia roztoku octu použitého na morenie osiva		2,5 – 5,0 %***	
Príprava roztoku	s koncentráciou	2,5 %	5,0 %
	ocot 8 %	0,31 l	0,62 l
	voda	0,69 l	0,38 l
Ochranná doba		žiadna	
Poznámky		krátkodobé namočenie semien	

*Vyjadrené ako kyselina octová.

**Morenie osiva tesne pred sejbou.

***Vyjadrené ako kyselina octová, pri príprave 1 litra roztoku s obsahom účinných látok v rozsahu 2,5 – 5,0 % sa zriedi 0,31 l 8 % octu s 0,69 l vody až 0,62 l 8 % octu s 0,38 l vody.

