

Plodina alebo okolnosti		všetky plodiny končeky prstov rukavíc a mechanické rezacie nástroje
Použitie vonku alebo na poli (F), použitie v skleníkoch (G) alebo v interiéroch (I)		F – použitie vonku alebo na poli G – použitie v skleníkoch
Regulovaní škodcovia alebo skupina škodcov		vírusy (mechanicky prenášané) napr. vírus mozaiky tabaku (<i>Tobacco mosaic virus</i> (TMV)), vírus mozaiky rajčiaka (<i>Tomato mosaic virus</i> (ToMV)), vírus miernej škvrnitosti papriky (<i>Pepper mild mottle virus</i> (PMMoV)), vírus zelenoškvrnitej mozaiky uhorky (<i>Cucumber green mottle mosaic virus</i> (CGMMV)), tobomavírus napadajúci rajčiaky (<i>Tomato brown rugose fruit viruses</i> (ToBRFV))
Srvátka	formulácia	TC – technický materiál
	obsah účinných látok	50 g/l
Aplikácia	druh metódy	dezinfekcia, namáčanie (dezinfekcia končiek prstov rukavíc a náradia pred každým použitím)*
	počet za vegetáciu (min., max.)	pred / po každom kontakte s rastlinou**
	interval medzi aplikáciami (min.)	pred / po každom kontakte s rastlinou**
Poznámky		Namáčajte 5 sekúnd rukavice a 5 minút mechanické rezacie nástroje.
		Z dôvodu účinnosti používajte srvátkový proteínový prášok s minimálne 80 % obsahom bielkovín.
		Srvátkový roztok pravidelne vymieňajte (napríklad po každom riadku plodín) na zabránenie krížovej kontaminácii rastlín.

*Náradie nepoužívať skôr ako 30 sekúnd po dezinfekcii.

**Neaplikovať na ošetrovanie končiek prstov tesne pred alebo počas zberu jedlých komodít.