

Plodina alebo okolnosti		jahoda záhradná <i>(Fragaria x Ananassa)</i> ostružina malinová <i>(Rubus idaeus)</i>	
Použitie vonku alebo na poli (F), použitie v skleníkoch (G) alebo v interiéroch (I)		F – použitie vonku alebo na poli	
Regulovaní škodcovia alebo skupina škodcov		pleseň sivá <i>(Botrytis cinerea)</i> múčnatka jahôd <i>(Podosphaera aphanis)</i> červená hniloba koreňa jahody <i>(Phytophthora fragariae var. fragariae)</i> koreňová hniloba maliny <i>(Phytophthora fragariae var. rubi)</i> antraknóza <i>(Colletotrichum acutatum)</i>	
Odvar prasličky	formulácia	DC – dispergovateľný koncentrát*	
	obsah účinnej látky	22,5 g/l	
Aplikácia	druh metódy	postrek**	
	rastová fáza a obdobie	skorá jar až koniec leta, obnova rastu (BBCH 1) až 2. úroda, väčšina plodov je vyfarbená (BBCH 89)	
	počet za vegetáciu (min., max.)	4 – 8	
	interval medzi aplikáciami (min.)	5 – 14 dní	
Dávka postreku		100 – 300 l/ha***	
Príprava postreku	pri dávke postreku	100 l	300 l
	odvar prasličky	10 l	30 l
	voda	90 l	270 l
Ochranná doba		žiadna	
Poznámky		Odvar použiť do 24 hodín po príprave.	

*Odvar je rastlinný homogenát extrahovaný horúcou vodou, filtrovaný (na použitie 10-násobne riedený)

**Neaplikovať v prípade vysokej teploty vzduchu.

***Pri príprave postreku dodržať 10-násobné riedenie odvaru, pomer riedenia je 1:9 (1 diel odvaru + 9 dielov vody).