

**Použitie ako herbicíd**

Plodina alebo okolnosti		<b>slaniská a solné močiare</b>
Použitie vonku alebo na poli (F), použitie v skleníkoch (G) alebo v interiéroch (I)		F – použitie vonku alebo na poli
Regulovaný škodcovia alebo skupina škodcov		<b><i>Baccharis halimifolia</i></b>
Chlorid sodný	formulácia	SP – prášok rozpustný vo vode
	obsah účinných látok	> 970 g/kg
Aplikácia	druh metódy	lokálna (bodová) aplikácia do otvorov vyvrtaných do pňov a na pôdu v bezprostrednej blízkosti pňov
	rastová fáza a obdobie	november až február
	počet za vegetáciu	1
	interval medzi aplikáciami	-
Aplikačná dávka	chlorid sodný	10 – 100 g na peň stromu 10 – 1 000 kg/ha*
	voda	-
Ochranná doba		-
Poznámky		Ošetrovanie je povolené len v oblastiach slanísk a slaných močiarov, ako ich definujú národné alebo miestne orgány.
		Ošetrovanie by sa malo vykonávať mimo obdobia dažďov.

\* za predpokladu hustoty rastlín od 0,1 m<sup>2</sup> do 1 m<sup>2</sup>