

Plodina alebo okolnosti		<b>pagaštan konský a pagaštan pleťový</b> ( <i>Aesculus hippocastanum</i> ; <i>Aesculus x Carnea</i> ) <b>rod javor – všetky druhy</b> ( <i>Acer</i> spp.)
Použitie vonku alebo na poli (F), použitie v skleníkoch (G) alebo v interiéroch (I)		F – použitie vonku alebo na poli
Regulovaní škodcovia alebo skupina škodcov		<b>baktéria <i>Pseudomonas syringae</i> pv <i>aesculi</i></b> (angl. názov: Bleeding canker of horse chesnut; česky názov: bakteriální slizotokové nekrózy jírovců)
Ocot	formulácia	kvapalina na dezinfekciu náradia
	obsah účinných látok	80 g/l (8 %)*
Aplikácia	druh metódy	dezinfekcia náradia pred použitím**
	rastová fáza a obdobie	1 krát za deň až pred každým použitím
	počet za vegetáciu (min., max.)	1 strom
Koncentrácia roztoku octu použitého na dezinfekciu		0,4 %***
Príprava roztoku	ocot 8 %	0,05 l
	voda	0,95 l
Ochranná doba		žiadna
Poznámky		čakacia doba 30 sekúnd po umytí

\*Vyjadrené ako kyselina octová.

\*\*Dezinfekcia náradia použitého pred pílením alebo rezaním stromov.

\*\*\*Vyjadrené ako kyselina octová, pri príprave roztoku je potrebné 50 ml 8 % octu zriediť s 950 ml vody.