

Použitie proti hmyzu

Plodina alebo okolnosť	rod tavoľník (Spiraea sp.)		
Použitie vonku alebo na poli (F), použitie v skleníkoch (G) alebo v interiéroch (I)	F – použitie vonku alebo na poli		
Regulovaní škodcovia alebo skupina škodcov	voška tavoľníková (Aphis spiraeaphaga)		
Macerát z príhľavy	formulácia	DC – dispergovateľný koncentrát*	
	obsah účinnej látky	75 g/l (čerstvá príhľava) alebo 15 g/l (suchá hmota)	
Aplikácia	druh metódy	postrek priamo na vošky	
	rastová fáza a obdobie	jar – leto	
	počet za vegetáciu (min., max.)	1 – 5	
	interval medzi aplikáciami (min.)	min. 7 dní, bežne 15 dní	
Dávka postreku	300 – 600 l/ha**		
Príprava postreku	pri dávke postreku	300 l	600 l
	macerát z príhľavy	60 l	120 l
	voda	240 l	480 l
Ochranná doba	7 dní		
Poznámky	Preventívne ošetrenie je neefektívne. Stačí 24 hodín macerácie pri 20 °C.		

*Macerát je rastlinný homogenát extrahovaný studenou vodou, filtrovaný (na použitie 5-násobne riedený).

**Pri príprave postreku dodržať 5-násobné riedenie macerátu, pomer riedenia je 1:4 (1 diel macerátu + 4 diely vody).