

Plodina alebo okolnosti		<b>ovocné plodiny iné ako drobné ovocné plodiny a vinič</b>
Použitie vonku alebo na poli (F), použitie v skleníkoch (G) alebo v interiéroch (I)		F – použitie vonku alebo na poli G – použitie v skleníkoch
Regulovaní škodcovia alebo skupina škodcov		<b>patogénne huby a baktérie</b>
Chitozán	formulácia	SP – rozpustný prášok
	obsah účinných látok	≥ 85 % chitozánu
Aplikácia	druh metódy	postrek*
	rastová fáza a obdobie	od zelené špičky listov 10 mm nad kvetnými pukmi – myšie uško (jadroviny), od prvých listov separovaných, zelené šupinky jemne otvorené, začiatok rozvíjania listov (kôstkoviny) (BBCH 10) do veľkosti plodu 90 % z konečnej veľkosti (BBCH 79)
	počet za vegetáciu (min., max.)	4 – 8
	interval medzi aplikáciami (min.)	2 týždne
Aplikačná dávka	chitozán	0,1 – 0,4 kg/ha
	voda	200 – 400 l/ha
Ochranná doba		žiadna
Poznámky		Nepriame pôsobenie, žiadne priame fungicídne a baktericídne účinky – elicitor, zvyšovanie odolnosti (obranyschopnosti) rastlín. Chitozán na použitie je možné pripraviť podľa ktoréhokoľvek z dvoch receptov.

\*Slabá až stredná intenzita postreku. Postrek sa pripravuje tesne pred aplikáciou.