

Plodina alebo okolnosti		vinič hroznorodý (<i>Vitis vinifera</i>) (VITVI)
Použitie vonku alebo na poli (F), použitie v skleníkoch (G) alebo v interiéroch (I)		F – použitie vonku alebo na poli
Regulovaní škodcovia alebo skupina škodcov		háďatko kalifornské (<i>Xiphinema index</i>) (XIPHIN)
Vičenec vikolistý – sušené pelety	formulácia	GR – granuly
	obsah účinných látok	1 000 g/kg
Aplikácia	druh metódy	rozhadzovanie, zapracovanie do pôdy
	rastová fáza a obdobie	jar alebo jeseň hlavné štádium rastu 0 (BBCH 00) aplikovať na miestach s výskytom škodcov
	počet za vegetáciu (min., max.)	1
	interval medzi aplikáciami (min.)	*
Aplikačná dávka	vičenec vikolistý – sušené pelety	10 000 kg/ha 1 kg/m ²
	voda	-
Ochranná doba		žiadna
Poznámky		Sušené pelety <i>Onobrychis viciifolia</i> (vičenca vikolistého) sa už používajú v odporúčanej dávke 3 500 kg/ha (3,5 t/ha) a sú vhodné aj na použitie v dávke 10 t/ha/rok podľa normy NFU44-051.

* aplikácia 1 krát ročne