

Plodina alebo okolnosti			oliva európska (<i>Olea europaea</i>) (OLVEU)	
Použitie vonku alebo na poli (F), použitie v skleníkoch (G) alebo v interiéroch (I)			F – použitie vonku alebo na poli	
Regulovaní škodcovia alebo skupina škodcov			škvrnitosť olivových listov (<i>Venturia oleaginea</i> , <i>Cycloconium oleaginum</i> , <i>Spilocaea oleaginea</i>) (CYCLOL)	
Hydroxid horečnatý E 528	formulácia	SC – kvapalný suspenzný koncentrát pre riedenie vodou		WP – dispergovateľný (zmáčateľný) prášok
	obsah účinných látok	700 g/l (500 g/kg)		1 000 g/kg
Aplikácia	druh metódy	postrek		
	rastová fáza a obdobie	od prvých listov úplne oddelených, sivozelenkastej farby (BBCH 11) do zberovej zrelosti: plody získajú typickú odrodovú farbu, zostávajú napnuté, vhodné na extrakciu oleja (BBCH 89)		
	počet za vegetáciu (min., max.)	1		
	interval medzi aplikáciami (min.)	-		
Dávka postreku		300 – 1 000 l/ha		
Príprava postreku	hydroxid horečnatý	100 % biely prášok	2,33 kg*	0,7 kg
		suspenzný koncentrát	3,33 l***	1,0 l
		suspenzný koncentrát	4,66 kg***	1,4 kg
	voda	300 l	1 000 l	
Maximálny obsah účinných látok (hydroxidu horečnatého)		7,0 kg/ha/rok		
Ochranná doba		0**		

* Dávka určená na základe receptúry v žiadosti základnej látky zohľadňujúcej 100 % čistotu hydroxidu horečnatého.

**Na základe údajov v žiadosti základnej látky nie je pre všetky jedlé plodiny potrebná žiadna ochranná doba po aplikácii základnej látky hydroxid horečnatý za predpokladu, že má potravinovú kvalitu, pokiaľ ide o relevantné nečistoty.

***Prepočet množstva suspenzného koncentráту v l/ha a kg/ha na základe potrebného množstva hydroxidu horečnatého (účinná látka).