

Plodina alebo okolnosti			ľuľok zemiakový (<i>Solanum tuberosum</i>) (SOLTU)	
Použitie vonku alebo na poli (F), použitie v skleníkoch (G) alebo v interiéroch (I)			F – použitie vonku alebo na poli	
Regulovaní škodcovia alebo skupina škodcov			pleseň zemiakov (<i>Phytophthora infestans</i>) (PHYTIN)	
Hydroxid horečnatý E 528	formulácia		SC – kvapalný suspenzný koncentrát pre riedenie vodou	WP – dispergovateľný (zmáčateľný) prášok
	obsah účinných látok		700 g/l (500 g/kg)	1 000 g/kg
Aplikácia	druh metódy		postrek	
	rastová fáza a obdobie		od vzchádzania, klíčky na povrchu pôdy (BBCH 09) do konca tvorby hlúz (BBCH 49)	
	počet za vegetáciu (min., max.)		10	
	interval medzi aplikáciami (min.)		7 dní	
Dávka postreku			300 – 500 l/ha	
Príprava postreku	hydroxid horečnatý	100 % biely prášok	1,4 kg*	0,84 kg
		suspenzný koncentrát	2,0 l***	1,20 l
		suspenzný koncentrát	2,8 kg***	1,68 kg
	voda		300 l	500 l
Maximálny obsah účinných látok (hydroxidu horečnatého)			42,0 kg/ha/rok (4,2 kg/ha/aplikáciu)	
Ochranná doba			0**	

* Dávka určená na základe receptúry v žiadosti základnej látky zohľadňujúcej 100 % čistotu hydroxidu horečnatého.

**Na základe údajov v žiadosti základnej látky nie je pre všetky jedlé plodiny potrebná žiadna ochranná doba po aplikácii základnej látky hydroxid horečnatý za predpokladu, že má potravinovú kvalitu, pokiaľ ide o relevantné nečistoty.

***Prepočet množstva suspenzného koncentráту v l/ha a kg/ha na základe potrebného množstva hydroxidu horečnatého (účinná látka).