

Plodina alebo okolnosti		rajčiak jedlý (<i>Solanum lycopersicum</i>) (LYPES)
Použitie vonku alebo na poli (F), použitie v skleníkoch (G) alebo v interiéroch (I)		F – použitie vonku alebo na poli G – použitie v trvalých skleníkoch
Regulovaní škodcovia alebo skupina škodcov		choroby prenášané pôdou hnedá hniloba (<i>Ralstonia solanacearum</i>) (RALSSO)
<i>Allium fistulosum</i> – sušené cibule a listy	formulácia	DC – dispergovateľný koncentrát
	obsah účinných látok	sušená rastlina (0,5 kg/l)*
Aplikácia	druh metódy	postrek na ošetrovanie pôdy
	rastová fáza a obdobie	15 – 30 dní pred sejbou (BBCH 00) počas celej sezóny
	počet (min., max.)	1 na plodinu (1 – 3 za rok)
	interval medzi aplikáciami (min.)	-
Aplikačná dávka	<i>Allium fistulosum</i> – sušené cibule a listy	325 – 375 kg/ha
	voda	650 – 750 l/ha
Ochranná doba		žiadna
Poznámky		produkt je možné použiť len na ošetrovanie pôdy pred výsadbou

* Pripravuje sa zmiešaním rozdrvených sušených kúskov rastliny *Allium fistulosum* s vodou a s následnou filtráciou a aplikáciou filtrátu.